



SORêga

Octobre 2022

# Bibliographie Espace Naturel, Faune et Flore

**TRANS  
FAIRE**



**environnement + ville**

SAS au capital de 100 000 €

SIRET 438 626 491 00049

3 passage Boutet

94110 Arcueil

Tél : 01 45 36 15 00

Fax : 01 47 40 11 01

contact@trans-faire.net

[www.trans-faire.net](http://www.trans-faire.net)







ESPACES NATURELS REMARQUABLES

Le site FR112013 - Sites de Seine-Saint-Denis situé à environ 1500 m à l'ouest et à 2000 m à l'est


Le site le plus proche est situé à environ 1500 m à l'ouest. Il s'agit du site « FR112013 – Sites de Seine-Saint-Denis » : Il existe au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune d'un grand intérêt en milieu urbain et péri-urbain. Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. Cette démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être des sites expérimentaux. Le site présent dans l'aire d'étude rapproché est celui de l'île Saint-Denis.

Douze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Cinq de ces espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore, le Pic noir et le Pic mar (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente.

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des ruisseaux, Buse variable, Épervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois).

Bien qu'une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis est semi-naturel, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore.

Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin-pêcheur d'Europe de nicher. La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelles de rivage. De grandes zones de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier...



Photographies du site FR112013 (source A. Locquet)



## Extrait du PLUi de Plaine Commune

**3.2.4 Compensation des arbres abattus**

Lorsque la conservation d'un arbre ne peut pas être assurée et qu'il doit être abattu, il est exigé que soit replanté trois arbres équivalents sur le terrain, en prenant en compte les recommandations en matière de surface de pleine terre et de distance recommandées vis-à-vis des façades prévues au paragraphe 3.2.2.

La notion d'« arbre équivalent » fait référence aux types de plantations définis au paragraphe 3.2.2.

Si la surface de pleine terre sur le terrain ne permet pas d'assurer la compensation par trois arbres équivalents, une compensation avec des arbres de moindre développement pourrait être autorisée conformément aux unités de plantation définies dans le paragraphe 3.2.2.

***Exemple : pour un arbre de grand développement abattu, trois arbres de grand développement devraient être replantés. Sachant que 3 arbres de grand développement = 24 (unités de plantation), il serait possible de replanter 1 arbre de grand développement (correspondant à 8 unités) + 3 arbres de moyen développement (12) + 2 arbres de petit développement (4) = 24 (unités de plantation).***

Si la surface de pleine terre ne permet pas d'assurer la compensation des arbres abattus sur le terrain, celle-ci pourra être réalisée sur l'espace public dans les mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus, sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie ou de toute emprise publique :

- Dans un rayon de 500 m autour de l'unité foncière concernée par le projet d'abattage,
- A défaut, la compensation devra être assurée sur le territoire de la commune concernée par le projet d'abattage,
- En dernier recours, la compensation devra être assurée sur le territoire de l'EPT Plaine Commune.

Lorsque l'état sanitaire de l'arbre impose son abattage, celui-ci ne sera compensé que par la plantation d'un arbre équivalent. Les arbres replantés au titre de la présente disposition ne sont pas pris en compte dans le calcul des unités de plantation du paragraphe 3.2.2.



FLORE

Une bibliographie pas représentative du territoire concerné par l'étude d'impact

Données bibliographiques

Plus de 660 taxons ont été recensés sur la commune de Saint-Denis selon le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). Dans cette liste, plus de 80 taxons ont été identifiés comme patrimonial, c'est-à-dire étant à enjeu du point de vue d'un statut de protection nationale ou régionale, de la Liste Rouge de la flore vasculaire d'Île-de-France, de la Directive Habitats, ou parce que déterminant de ZNIEFF.

Cependant, cette liste exhaustive n'est pas représentative du territoire. La plupart des espèces florales repérées doivent être présente dans les parcs de la ville, hors du secteur concerné par les opérations. Le périmètre de cadrage défini est extrêmement urbain et laisse très peu de place à la faune et la flore. La seule opération qui pourrait faire l'objet d'un inventaire faune flore et qui présenterai un certain intérêt est l'ilot Haguette qui accueille actuellement un jardin participatif de 400 m2 et un espace vert pour l'instant enclôsné.



Erable négundo (source Thema, 2021)



Séneçon sud-africain (source Thema, 2021)

Des espèces envahissantes

Les plantes exotiques envahissantes d'Île-de-France

Données bibliographiques

Le CBNBP indique que 14 taxons non-indigènes présentant une cotation invasive au sens du catalogue de la flore vasculaire ont été recensés sur l'ensemble de la commune de Saint-Denis :

- Erable Negundo (*Acer negundo*).
- Ailante glanduleux (*Ailanthus altissima*).
- Bident feuillé (*Bidens frondosa*).
- Buddleja du père David (*Buddleja davidii*).
- Élodée du Canada (*Elodea canadensis*).
- Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi (*Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier).
- Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs (*Impatiens parviflora* DC.).
- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*).
- Renouée de Sakhaline (*Reynoutria sachalinensis*).
- Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*).
- Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens*).
- Solidage du Canada (*Solidago canadensis*).
- Solidage géant (*Solidago gigantea*).
- Aster des jardins (*Symphyotrichum novi-belgii*).




# Compte-rendu de bibliographie flore

Mission : 8981  
Date : 220922  
Observateur : Bibliographie CBNBP  
Conditions : [📷]

| Relevé      | X         | Y        | Départ | Fin |
|-------------|-----------|----------|--------|-----|
| Saint-Denis | 48.935435 | 2.351483 |        |     |

## Localisation des relevés


Relevé ● Saint-Denis





# Statistiques

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Nombre d'espèces        | dont indigènes        |
| 667                     | 473                   |
| dont protégées France   | dont protégées région |
| 1                       | 4                     |
| dont Directive Habitats | dont ZNIEFF           |
| 1                       | 22                    |
| dont menacées           | dont peu fréquentes   |
| 45                      | 257                   |
| dont zones humides      | dont EEE              |
| 87                      | 31                    |





# Espèces remarquables

## Espèces protégées nationales

| Nom scientifique                                   |
|----------------------------------------------------|
| Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003 |

## Espèces protégées régionales

| Nom scientifique                |
|---------------------------------|
| Bidens radiata Thuill., 1799    |
| Ranunculus parviflorus L., 1758 |
| Sison amomum L., 1753           |
| Zannichellia palustris L., 1753 |

## Espèces Directive Habitats

| Nom scientifique                                   |
|----------------------------------------------------|
| Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003 |

## Espèces menacées

| Nom scientifique                  | UICN région |
|-----------------------------------|-------------|
| Agrostemma githago L., 1753       | CR          |
| Crepis foetida L., 1753           | CR          |
| Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821 | CR          |
| Lactuca saligna L., 1753          | CR          |
| Physalis alkekengi L., 1753       | CR          |
| Sison segetum L., 1753            | CR          |
| Vitis vinifera L., 1753           | CR          |
| Galeopsis ladanum L., 1753        | CR*         |

## Espèces menacées

| Nom scientifique                                                 | UICN région |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844                         | DD          |
| Carduus acanthoides L., 1753                                     | DD          |
| Carex vulpina L., 1753                                           | DD          |
| Chenopodium ficifolium Sm., 1800                                 | DD          |
| Crepis biennis L., 1753                                          | DD          |
| Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986 | DD          |
| Galium spurium L., 1753                                          | DD          |
| Nepeta cataria L., 1753                                          | DD          |
| Populus nigra L., 1753                                           | DD          |
| Veronica agrestis L., 1753                                       | DD          |
| Viola tricolor L., 1753                                          | DD          |
| Anthemis cotula L., 1753                                         | EN          |
| Atropa belladonna L., 1753                                       | EN          |
| Centaurea calcitrapa L., 1753                                    | EN          |
| Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983                     | EN          |
| Delphinium consolida L., 1753                                    | EN          |
| Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821                                | EN          |
| Hyoscyamus niger L., 1753                                        | EN          |
| Leonurus cardiaca L., 1753                                       | EN          |
| Ranunculus arvensis L., 1753                                     | EN          |
| Silene conica L., 1753                                           | EN          |
| Sium latifolium L., 1753                                         | EN          |
| Veronica praecox All., 1789                                      | EN          |

## Espèces menacées

| Nom scientifique                                             | UICN région |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Bidens cernua L., 1753                                       | NT          |
| Calendula arvensis L., 1763                                  | NT          |
| Carex disticha Huds., 1762                                   | NT          |
| Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | NT          |
| Chenopodium vulvaria L., 1753                                | NT          |
| Cynoglossum officinale L., 1753                              | NT          |
| Heliotropium europaeum L., 1753                              | NT          |
| Lathyrus hirsutus L., 1753                                   | NT          |
| Misopates orontium (L.) Raf., 1840                           | NT          |
| Papaver argemone L., 1753                                    | NT          |
| Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802                       | NT          |
| Samolus valerandi L., 1753                                   | NT          |
| Neslia paniculata (L.) Desv., 1815                           | RE          |
| Bidens radiata Thuill., 1799                                 | VU          |
| Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003           | VU          |
| Fumaria parviflora Lam., 1788                                | VU          |
| Galium parisiense L., 1753                                   | VU          |
| Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869                          | VU          |
| Lathyrus nissolia L., 1753                                   | VU          |
| Lemna gibba L., 1753                                         | VU          |
| Ranunculus parviflorus L., 1758                              | VU          |
| Scandix pecten-veneris L., 1753                              | VU          |
| Teucrium scordium L., 1753                                   | VU          |
| Thlaspi arvense L., 1753                                     | VU          |
| Ulmus laevis Pall., 1784                                     | VU          |



Espèces ZNIEFF

| Nom scientifique                                   |
|----------------------------------------------------|
| Achillea ptarmica L., 1753                         |
| Atropa belladonna L., 1753                         |
| Bidens cernua L., 1753                             |
| Bidens radiata Thuill., 1799                       |
| Carex disticha Huds., 1762                         |
| Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983       |
| Crepis biennis L., 1753                            |
| Delphinium consolida L., 1753                      |
| Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003 |
| Fumaria parviflora Lam., 1788                      |
| Galium parisiense L., 1753                         |
| Groenlandia densa (L.) Fourn., 1869                |
| Hordeum secalinum Schreb., 1771                    |
| Potamogeton lucens L., 1753                        |
| Ranunculus arvensis L., 1753                       |
| Ranunculus parviflorus L., 1758                    |
| Samolus valerandi L., 1753                         |
| Silene conica L., 1753                             |
| Sium latifolium L., 1753                           |
| Teucrium scordium L., 1753                         |
| Ulmus laevis Pall., 1784                           |
| Veronica praecox All., 1789                        |



Espèces de zones humides

| Nom scientifique                          |
|-------------------------------------------|
| Achillea ptarmica L., 1753                |
| Agrostis gigantea Roth, 1788              |
| Agrostis stolonifera L., 1753             |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790        |
| Althaea officinalis L., 1753              |
| Angelica sylvestris L., 1753              |
| Argentina anserina (L.) Rydb., 1899       |
| Aristolochia clematitis L., 1753          |
| Berula erecta (Huds.) Coville, 1893       |
| Betula pubescens Ehrh., 1791              |
| Bidens cernua L., 1753                    |
| Bidens frondosa L., 1753                  |
| Bidens radiata Thuill., 1799              |
| Bidens tripartita L., 1753                |
| Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905  |
| Cardamine flexuosa With., 1796            |
| Carex disticha Huds., 1762                |
| Carex otrubae Podp., 1922                 |
| Carex riparia Curtis, 1783                |
| Carex vulpina L., 1753                    |
| Cirsium palustre (L.) Scop., 1772         |
| Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 |
| Epilobium hirsutum L., 1753               |
| Epilobium parviflorum Schreb., 1771       |
| Eupatorium cannabinum L., 1753            |

Espèces de zones humides

| Nom scientifique                                     |
|------------------------------------------------------|
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879                |
| Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919                |
| Gnaphalium uliginosum L., 1753                       |
| Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824        |
| Humulus lupulus L., 1753                             |
| Hypericum humifusum L., 1753                         |
| Iris pseudacorus L., 1753                            |
| Juncus bufonius L., 1753                             |
| Juncus bulbosus L., 1753                             |
| Juncus compressus Jacq., 1762                        |
| Juncus conglomeratus L., 1753                        |
| Juncus effusus L., 1753                              |
| Juncus inflexus L., 1753                             |
| Lycopus europaeus L., 1753                           |
| Lysimachia nummularia L., 1753                       |
| Lysimachia vulgaris L., 1753                         |
| Lythrum salicaria L., 1753                           |
| Mentha arvensis L., 1753                             |
| Mentha longifolia (L.) Huds., 1762                   |
| Mentha spicata L., 1753                              |
| Mentha suaveolens Ehrh., 1792                        |
| Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794                 |
| Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812                |
| Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 |

Espèces de zones humides

| Nom scientifique                                          |
|-----------------------------------------------------------|
| Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821                       |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800               |
| Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 |
| Phalaris arundinacea L., 1753                             |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840         |
| Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966                  |
| Populus alba L., 1753                                     |
| Populus nigra L., 1753                                    |
| Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800                   |
| Ranunculus repens L., 1753                                |
| Ranunculus sardous Crantz, 1763                           |
| Ranunculus sceleratus L., 1753                            |
| Ribes rubrum L., 1753                                     |
| Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821                        |
| Rorippa palustris (L.) Besser, 1821                       |
| Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821                      |
| Rubus caesius L., 1753                                    |
| Rumex conglomeratus Murray, 1770                          |
| Rumex hydrolapathum Huds., 1778                           |
| Salix alba L., 1753                                       |
| Salix cinerea L., 1753                                    |
| Salix viminalis L., 1753                                  |
| Samolus valerandi L., 1753                                |

Espèces de zones humides

| Nom scientifique                          |
|-------------------------------------------|
| Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 |
| Scrophularia auriculata L., 1753          |
| Scutellaria galericulata L., 1753         |
| Sium latifolium L., 1753                  |
| Solanum dulcamara L., 1753                |
| Sonchus palustris L., 1753                |
| Sparganium erectum L., 1753               |
| Stachys palustris L., 1753                |
| Symphytum officinale L., 1753             |
| Teucrium scordium L., 1753                |
| Thalictrum flavum L., 1753                |
| Trifolium squamosum L., 1759              |
| Typha angustifolia L., 1753               |
| Typha latifolia L., 1753                  |
| Ulmus laevis Pall., 1784                  |



Espèces exotiques envahissantes

| Nom scientifique                                 | EEE région              |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Acer negundo L., 1753                            | Avérées implantées      |
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916        | Avérées implantées      |
| Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877              | Potentielles implantées |
| Asclepias syriaca L., 1753                       | Liste d'alerte          |
| Berberis aquifolium Pursh, 1814                  | Potentielles implantées |
| Bidens frondosa L., 1753                         | Potentielles implantées |
| Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973           | Potentielles implantées |
| Buddleja davidii Franch., 1887                   | Potentielles implantées |
| Elodea canadensis Michx., 1803                   | Avérées implantées      |
| Erigeron annuus (L.) Desf., 1804                 | Potentielles implantées |
| Erigeron canadensis L., 1753                     | Potentielles implantées |
| Erigeron sumatrensis Retz., 1810                 | Potentielles implantées |
| Galega officinalis L., 1753                      | Avérées implantées      |
| Helianthus tuberosus L., 1753                    | Potentielles implantées |
| Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895  | Avérées implantées      |
| Laburnum anagyroides Medik., 1787                | Avérées implantées      |
| Lycium barbarum L., 1753                         | Potentielles implantées |
| Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922   | Avérées implantées      |
| Prunus cerasus L., 1753                          | Avérées implantées      |
| Prunus laurocerasus L., 1753                     | Potentielles implantées |
| Prunus serotina Ehrh., 1784                      | Avérées implantées      |
| Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834      | Liste d'alerte          |
| Reynoutria japonica Houtt., 1777                 | Avérées implantées      |
| Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 | Avérées implantées      |
| Robinia pseudoacacia L., 1753                    | Avérées implantées      |

Espèces exotiques envahissantes

| Nom scientifique                                | EEE région              |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Senecio inaequidens DC., 1838                   | Potentielles implantées |
| Solidago canadensis L., 1753                    | Avérées implantées      |
| Solidago gigantea Aiton, 1789                   | Avérées implantées      |
| Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914       | Potentielles implantées |
| Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995 | Avérées implantées      |
| Syringa vulgaris L., 1753                       | Avérées implantées      |



Relevés

| Nom scientifique                                   | Statut région  | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région         |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| Abutilon theophrasti Medik., 1787                  | Planté/cultivé | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Acer campestre L., 1753                            | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Acer negundo L., 1753                              | Eurynaturalisé | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées |
| Acer platanoides L., 1753                          | Eurynaturalisé | CC               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Acer pseudoplatanus L., 1753                       | Eurynaturalisé | CCC              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Achillea millefolium L., 1753                      | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Achillea ptarmica L., 1753                         | Indigène       | R                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         | Déterminant ZNIEFF |                    |
| Aegilops cylindrica Host, 1802                     | Accidentel     | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Aegopodium podagraria L., 1753                     | Indigène       | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Aesculus hippocastanum L., 1753                    | Subspontané    | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Aethusa cynapium L., 1753                          | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Agrimonia eupatoria L., 1753                       | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Agrostemma githago L., 1753                        | Indigène       | RRR              |          |             |        | LC           | CR          |         |                    |                    |
| Agrostis capillaris L., 1753                       | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Agrostis gigantea Roth, 1788                       | Indigène       | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Agrostis stolonifera L., 1753                      | Indigène       | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916          | Eurynaturalisé | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées |
| Ajuga reptans L., 1753                             | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Alcea rosea L., 1753                               | Subspontané    | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Allium moly L., 1753                               | Planté/cultivé | .                |          |             |        | NT           |             |         |                    |                    |
| Allium oleraceum L., 1753                          | Indigène       | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Allium vineale L., 1753                            | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790                 | Indigène       | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Alopecurus myosuroides Huds., 1762                 | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Althaea officinalis L., 1753                       | Indigène       | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Alyssum simplex Rudolphi, 1799                     | Accidentel     | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |



| Nom scientifique                                | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF | EEE région |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|------------|------------|
| Amaranthus albus L., 1759                       | Sténonaturalisé | R                |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Amaranthus blitoides S.Watson, 1877             | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Amaranthus blitum L., 1753                      | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Amaranthus deflexus L., 1771                    | Eurynaturalisé  | AR               |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Amaranthus graecizans L., 1753                  | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Amaranthus hybridus L., 1753                    | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Amaranthus hypochondriacus L., 1753             | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Amaranthus powellii S.Watson, 1875              |                 |                  |          |             |        |              |             |         |            |            |
| Amaranthus retroflexus L., 1753                 | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Ammi majus L., 1753                             | Eurynaturalisé  | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817         | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Andryala integrifolia L., 1753                  | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Angelica sylvestris L., 1753                    | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |            |
| Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945              | Sans objet      | .                |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934              | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934            | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934            | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Anthemis cotula L., 1753                        | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | EN          |         |            |            |
| Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808               | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814         | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Anthyllis vulneraria L., 1753                   | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Antirrhinum majus L., 1753                      | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812           | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Aphanes arvensis L., 1753                       | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Aquilegia vulgaris L., 1753                     | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842          | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Arctium lappa L., 1753                          | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Arctium minus (Hill) Bernh., 1800               | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844        | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | DD          |         |            |            |
| Arenaria serpyllifolia L., 1753                 | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |



| Nom scientifique                                               | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Argentina anserina (L.) Rydb., 1899                            | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Aristolochia clematitis L., 1753                               | Indigène        | R                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800          | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Artemisia absinthium L., 1753                                  | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Artemisia annua L., 1753                                       | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877                            | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Artemisia vulgaris L., 1753                                    | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Arum italicum Mill., 1768                                      | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Asclepias syriaca L., 1753                                     | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Liste d'alerte          |
| Asparagus officinalis L., 1753                                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Asplenium ruta-muraria L., 1753                                | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Asplenium scolopendrium L., 1753                               | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Astragalus glycyphyllos L., 1753                               | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Atriplex hortensis L., 1753                                    | Subspontané     | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Atriplex patula L., 1753                                       | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805                        | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Atropa belladonna L., 1753                                     | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Avena fatua L., 1753                                           | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Avena sativa L., 1753                                          | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Ballota nigra L., 1753                                         | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812                              | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Bassia scoparia (L.) Voss, 1903                                | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Bellis perennis L., 1753                                       | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Berberis aquifolium Pursh, 1814                                | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Berteroa incana (L.) DC., 1821                                 | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Berula erecta (Huds.) Coville, 1893                            | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Beta vulgaris L., 1753                                         | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |

| Nom scientifique                               | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Betula pendula Roth, 1788                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Betula pubescens Ehrh., 1791                   | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Bidens cernua L., 1753                         | Indigène        | RR               |          |             | Ar. ZH | LC           | NT          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Bidens frondosa L., 1753                       | Eurynaturalisé  | AR               |          |             | Ar. ZH | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Bidens radiata Thuill., 1799                   | Indigène        | RRR              |          | PR          | Ar. ZH | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Bidens tripartita L., 1753                     | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Bidens x garumnae Jeanj. & Debray, 1933        | Sans objet      | .                |          |             |        |              |             |         |                    |                         |
| Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905       | Planté/cultivé  | .                |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |                    |                         |
| Borago officinalis L., 1753                    | Subspontané     | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Brassica napus L., 1753                        | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833           | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869          | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973         | Eurynaturalisé  | AR               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Bromus hordeaceus L., 1753                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Bryonia dioica Jacq., 1774                     |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |                         |
| Buddleja davidii Franch., 1887                 | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Bunias orientalis L., 1753                     | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788         | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Calendula arvensis L., 1763                    | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | NT          |         |                    |                         |
| Campanula rapunculoides L., 1753               | Planté/cultivé  | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Campanula rapunculus L., 1753                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Campanula rotundifolia L., 1753                | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Cannabis sativa L., 1753                       | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Capsella rubella Reut., 1854                   | Indigène        | ?                |          |             |        |              |             |         |                    |                         |
| Cardamine flexuosa With., 1796                 | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Cardamine hirsuta L., 1753                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |



| Nom scientifique                           | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|------------|
| Carduus acanthoides L., 1753               | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           | DD          |         |                    |            |
| Carduus crispus L., 1753                   | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carduus nutans L., 1753                    | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carduus tenuiflorus Curtis, 1793           | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carex disticha Huds., 1762                 | Indigène        | R                |          |             | Ar. ZH | LC           | NT          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Carex divulsa Stokes, 1787                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carex hirta L., 1753                       | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carex otrubae Podp., 1922                  | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carex riparia Curtis, 1783                 | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carex sylvatica Huds., 1762                | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carex vulpina L., 1753                     | Indigène        | RRR              |          |             | Ar. ZH | LC           | DD          |         |                    |            |
| Carlina vulgaris L., 1753                  | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Carpinus betulus L., 1753                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953    | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Centaurea calcitrapa L., 1753              | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | EN          |         |                    |            |
| Centaurea decipiens Thuill., 1799          | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Centaurea jacea L., 1753                   | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Centaurea nigra L., 1753                   | Sans objet      | .                |          |             |        | DD           | LC          |         |                    |            |
| Centaurea scabiosa L., 1753                | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Centaurea solstitialis L., 1753            | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Centaurium erythraea Rafn, 1800            | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898    | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cerastium brachypetalum Pers., 1805        |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Cerastium fontanum Baumg., 1816            | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cerastium glomeratum Thuill., 1799         | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cerastium pumilum Curtis, 1777             | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cerastium semidecandrum L., 1753           | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940 |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Ceratophyllum demersum L., 1753            | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870        |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Chaerophyllum temulum L., 1753             | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |

| Nom scientifique                                               | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|------------|
| Chelidonium majus L., 1753                                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012   | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | NT          |         |                    |            |
| Chenopodium album L., 1753                                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Chenopodium ficifolium Sm., 1800                               | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | DD          |         |                    |            |
| Chenopodium strictum Roth, 1821                                | Sans objet      | .                |          |             |        | DD           |             |         |                    |            |
| Chenopodium vulvaria L., 1753                                  | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | NT          |         |                    |            |
| Choisya ternata Kunth, 1823                                    | Planté/cultivé  | .                |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Chondrilla juncea L., 1753                                     | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cichorium intybus L., 1753                                     | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cirsium arvense (L.) Scop., 1772                               | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cirsium palustre (L.) Scop., 1772                              | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838                              | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Clathrus ruber [Micheli] : Pers.                               |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798                      | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Clematis vitalba L., 1753                                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Clinopodium vulgare L., 1753                                   | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983                   | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Colutea arborescens L., 1753                                   | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Conium maculatum L., 1753                                      | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Convallaria majalis L., 1753                                   | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Convolvulus arvensis L., 1753                                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Convolvulus sepium L., 1753                                    | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Convolvulus silvaticus Kit., 1805                              | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Cornus mas L., 1753                                            | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cornus sanguinea L., 1753                                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Coronilla varia L., 1753                                       | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Corylus avellana L., 1753                                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891                          | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Crataegus monogyna Jacq., 1775                                 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |



| Nom scientifique                                           | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|------------|
| Crepis biennis L., 1753                                    | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | DD          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Crepis bursifolia L., 1753                                 | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840                        | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Crepis foetida L., 1753                                    | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | CR          |         |                    |            |
| Crepis setosa Haller f., 1797                              | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Crepis vesicaria L., 1753                                  | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cyanus segetum Hill, 1762                                  | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800       | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805                          | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cynoglossum officinale L., 1753                            | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | NT          |         |                    |            |
| Cynosurus cristatus L., 1753                               | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Cytisus scoparius (L.) Link, 1822                          | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Dactylis glomerata L., 1753                                | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Datura stramonium L., 1753                                 | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Daucus carota L., 1753                                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Delphinium ajacis L., 1753                                 | Subspontané     | .                |          |             |        | EN           |             |         |                    |            |
| Delphinium consolida L., 1753                              | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812                  | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |            |
| Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007 |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa, 1837                     |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Digitalis purpurea L., 1753                                | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771                     | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Diploaxis muralis (L.) DC., 1821                           | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | EN          |         |                    |            |
| Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821                        | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Diploaxis viminea (L.) DC., 1821                           | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | CR          |         |                    |            |
| Dipsacus fullonum L., 1753                                 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973                   | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Draba verna L., 1753                                       | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002      | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Dysphania anthelmintica (L.) Mosyakin & Clemants, 2002     | Accidentel      | .                |          |             |        |              |             |         |                    |            |

| Nom scientifique                                                 | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812                       | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Echium vulgare L., 1753                                          | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788                               | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Elodea canadensis Michx., 1803                                   | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées      |
| Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986 | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | DD          |         |                    |                         |
| Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Epilobium angustifolium L., 1753                                 | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831                             | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Epilobium hirsutum L., 1753                                      | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Epilobium parviflorum Schreb., 1771                              | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Epilobium tetragonum L., 1753                                    | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769                          | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Equisetum arvense L., 1753                                       | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907            | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Eragrostis minor Host, 1809                                      | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Erigeron acris L., 1753                                          | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Erigeron annuus (L.) Desf., 1804                                 | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Erigeron bonariensis L., 1753                                    | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Erigeron canadensis L., 1753                                     | Eurynaturalisé  | CCC              |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Erigeron sumatrensis Retz., 1810                                 | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789                             | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003               | Indigène        | RRR              | PN1      |             |        | NT           | VU          | DH 2-4  | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852                                  | Indigène        | CC               |          |             |        |              | LC          |         |                    |                         |
| Eryngium campestre L., 1753                                      | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Erysimum cheiranthoides L., 1753                                 | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Euonymus europaeus L., 1753                                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Eupatorium cannabinum L., 1753                                   | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |



| Nom scientifique                          | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région         |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| Euphorbia cyparissias L., 1753            | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Euphorbia exigua L., 1753                 | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Euphorbia helioscopia L., 1753            | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Euphorbia lathyris L., 1753               | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Euphorbia maculata L., 1753               | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Euphorbia peplus L., 1753                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 1790    | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Fagus sylvatica L., 1753                  | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970    | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971       | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Festuca rubra L., 1753                    | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Ficaria verna Huds., 1762                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Ficus carica L., 1753                     | Subspontané     | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879     | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Foeniculum vulgare Mill., 1768            | Eurynaturalisé  | AR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Fragaria vesca L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Fraxinus excelsior L., 1753               | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Fumaria officinalis L., 1753              | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Fumaria parviflora Lam., 1788             | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |                    |
| Galega officinalis L., 1753               | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées |
| Galeopsis ladanum L., 1753                | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           | CR*         |         |                    |                    |
| Galeopsis tetrahit L., 1753               | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Galinsoga parviflora Cav., 1795           | Sténonaturalisé | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798 | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Galium album Mill., 1768                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Galium aparine L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Galium mollugo L., 1753                   | Sans objet      | .                |          |             |        |              | NA          |         |                    |                    |
| Galium parisiense L., 1753                | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |                    |
| Galium spurium L., 1753                   | Indigène        | RRR              |          |             |        |              | DD          |         |                    |                    |

| Nom scientifique                                | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Geranium dissectum L., 1755                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Geranium molle L., 1753                         | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Geranium pusillum L., 1759                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759               | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Geranium robertianum L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Geranium rotundifolium L., 1753                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Geum urbanum L., 1753                           | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781        | Accidentel      | .                |          |             |        | NT           |             |         |                    |                         |
| Glechoma hederacea L., 1753                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919           | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Gnaphalium uliginosum L., 1753                  | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869             | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967     | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Hedera helix L., 1753                           | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Helianthus annuus L., 1753                      | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Helianthus tuberosus L., 1753                   | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Heliotropium europaeum L., 1753                 | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | NT          |         |                    |                         |
| Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973       | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824   | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées      |
| Heracleum sphondylium L., 1753                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Herniaria glabra L., 1753                       | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Herniaria hirsuta L., 1753                      | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Hesperis matronalis L., 1753                    | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Hieracium murorum L., 1753                      | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Hieracium sabaudum L., 1753                     | Indigène        | AR               |          |             |        |              | LC          |         |                    |                         |
| Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826      | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Hippocrepis comosa L., 1753                     | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847      | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |



| Nom scientifique                                           | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| Holcus lanatus L., 1753                                    | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Hordeum murinum L., 1753                                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Hordeum secalinum Schreb., 1771                            | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         | Déterminant ZNIEFF |                    |
| Humulus lupulus L., 1753                                   | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Hyoscyamus niger L., 1753                                  | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | EN          |         |                    |                    |
| Hypericum humifusum L., 1753                               | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Hypericum perforatum L., 1753                              | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Hypochaeris radicata L., 1753                              | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Ilex aquifolium L., 1753                                   | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Impatiens parviflora DC., 1824                             | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836                          |                 |                  |          |             |        |              |             |         |                    |                    |
| Iris foetidissima L., 1753                                 | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Iris germanica L., 1753                                    | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Iris pseudacorus L., 1753                                  | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Isatis tinctoria L., 1753                                  | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791                            | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Juglans regia L., 1753                                     | Eurynaturalisé  | CC               |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Juncus bufonius L., 1753                                   | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Juncus bulbosus L., 1753                                   | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Juncus compressus Jacq., 1762                              | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Juncus conglomeratus L., 1753                              | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Juncus effusus L., 1753                                    | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Juncus inflexus L., 1753                                   | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827                         | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827                          | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Knautia arvensis (L.) Coult., 1828                         | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Laburnum anagyroides Medik., 1787                          | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | LC           |             |         |                    | Avérées implantées |

| Nom scientifique                        | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF | EEE région |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-------|--------------|-------------|---------|------------|------------|
| Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791      | Indigène        | C                |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lactuca saligna L., 1753                | Indigène        | RRR              |          |             |       | LC           | CR          |         |            |            |
| Lactuca serriola L., 1756               | Indigène        | CCC              |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lactuca virosa L., 1753                 | Indigène        | AC               |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lamium album L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lamium amplexicaule L., 1753            | Indigène        | C                |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lamium purpureum L., 1753               | Indigène        | CCC              |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lapsana communis L., 1753               | Indigène        | CCC              |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lathyrus hirsutus L., 1753              | Indigène        | R                |          |             |       | LC           | NT          |         |            |            |
| Lathyrus latifolius L., 1753            | Eurynaturalisé  | C                |          |             |       | LC           |             |         |            |            |
| Lathyrus nissolia L., 1753              | Indigène        | RR               |          |             |       | LC           | VU          |         |            |            |
| Lathyrus pratensis L., 1753             | Indigène        | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lathyrus sativus L., 1753               | Planté/cultivé  | .                |          |             |       | NA           |             |         |            |            |
| Lathyrus tuberosus L., 1753             | Indigène        | AC               |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Laurus nobilis L., 1753                 | Subspontané     | .                |          |             |       | LC           |             |         |            |            |
| Lemna gibba L., 1753                    | Indigène        | RR               |          |             |       | LC           | VU          |         |            |            |
| Lemna minor L., 1753                    | Indigène        | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Leontodon saxatilis Lam., 1779          | Indigène        | AR               |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Leonurus cardiaca L., 1753              | Indigène        | RR               |          |             |       | NT           | EN          |         |            |            |
| Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812 |                 |                  |          |             |       |              |             |         |            |            |
| Lepidium densiflorum Schrad., 1832      | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |       | NA           |             |         |            |            |
| Lepidium didymum L., 1767               | Sténonaturalisé | RR               |          |             |       | NA           |             |         |            |            |
| Lepidium draba L., 1753                 | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |       | LC           |             |         |            |            |
| Lepidium graminifolium L., 1759         | Sténonaturalisé | RR               |          |             |       | LC           |             |         |            |            |
| Lepidium latifolium L., 1753            | Sténonaturalisé | RR               |          |             |       | LC           |             |         |            |            |
| Lepidium ruderales L., 1753             | Indigène        | RR               |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lepidium squamatum Forssk., 1775        | Indigène        | C                |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |
| Lepidium virginicum L., 1753            | Sténonaturalisé | RR               |          |             |       | NA           |             |         |            |            |
| Leucanthemum vulgare Lam., 1779         | Indigène        | CCC              |          |             |       | DD           | LC          |         |            |            |
| Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810       | Planté/cultivé  | .                |          |             |       | NA           |             |         |            |            |
| Ligustrum vulgare L., 1753              | Indigène        | CCC              |          |             |       | LC           | LC          |         |            |            |



| Nom scientifique                                          | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF | EEE région              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|------------|-------------------------|
| Linaria supina (L.) Chaz., 1790                           | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Linaria vulgaris Mill., 1768                              | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Linum usitatissimum L., 1753                              | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |            |                         |
| Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lobularia maritima (L.) Desv., 1815                       | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | LC           |             |         |            |                         |
| Lolium perenne L., 1753                                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lonicera periclymenum L., 1753                            | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lotus corniculatus L., 1753                               | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lotus glaber Mill., 1768                                  | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lycium barbarum L., 1753                                  | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |            | Potentielles implantées |
| Lycium chinense Mill., 1768                               | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |                         |
| Lycopsis arvensis L., 1753                                | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lycopus europaeus L., 1753                                | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009          | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009        | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lysimachia nummularia L., 1753                            | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lysimachia vulgaris L., 1753                              | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                         |
| Lythrum salicaria L., 1753                                | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                         |
| Malus domestica Borkh., 1803 [nom. cons.]                 |                 |                  |          |             |        |              |             |         |            |                         |
| Malva moschata L., 1753                                   | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Malva neglecta Wallr., 1824                               | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Malva sylvestris L., 1753                                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Matricaria chamomilla L., 1753                            | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Matricaria discoidea DC., 1838                            | Eurnaturalisé   | CCC              |          |             |        | NA           |             |         |            |                         |
| Medicago arabica (L.) Huds., 1762                         | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Medicago lupulina L., 1753                                | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Medicago minima (L.) L., 1754                             | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |
| Medicago sativa L., 1753                                  | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                         |

| Nom scientifique                          | Statut région  | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF | EEE région |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|------------|------------|
| Melilotus albus Medik., 1787              | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779     | Indigène       | AC               |          |             |        |              | LC          |         |            |            |
| Melilotus sulcatus Desf., 1799            | Accidentel     | .                |          |             |        |              |             |         |            |            |
| Melissa officinalis L., 1753              | Eurynaturalisé | AC               |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Mentha arvensis L., 1753                  | Indigène       | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |            |
| Mentha longifolia (L.) Huds., 1762        | Planté/cultivé | .                |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |            |            |
| Mentha spicata L., 1753                   | Subspontané    | .                |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |            |            |
| Mentha suaveolens Ehrh., 1792             | Indigène       | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |            |
| Mentha x piperita L., 1753                | Planté/cultivé | .                |          |             |        |              |             |         |            |            |
| Mercurialis annua L., 1753                | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Mercurialis perennis L., 1753             | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Milium effusum L., 1753                   | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Misopates orontium (L.) Raf., 1840        | Indigène       | RR               |          |             |        | LC           | NT          |         |            |            |
| Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811   | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Morus alba L., 1753                       | Planté/cultivé | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842     | Indigène       | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764         | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794      | Indigène       | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |            |
| Myriophyllum spicatum L., 1753            | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Najas marina L., 1753                     | Indigène       | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812     | Indigène       | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |            |
| Nepeta cataria L., 1753                   | Indigène       | RR               |          |             |        | NT           | DD          |         |            |            |
| Neslia paniculata (L.) Desv., 1815        | Indigène       | NRR              |          |             |        | NT           | RE          |         |            |            |
| Nicotiana rustica L., 1753                | Planté/cultivé | .                |          |             |        |              |             |         |            |            |
| Nigella damascena L., 1753                | Planté/cultivé | .                |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Nuphar lutea (L.) Sm., 1809               | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Oenothera biennis L., 1753                | Eurynaturalisé | AC               |          |             |        | NA           |             |         |            |            |
| Onobrychis viciifolia Scop., 1772         | Eurynaturalisé | AR               |          |             |        | LC           |             |         |            |            |
| Onopordum acanthium L., 1753              | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |
| Ophrys apifera Huds., 1762                | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |            |



| Nom scientifique                                            | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF | EEE région            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|------------|-----------------------|
| Origanum vulgare L., 1753                                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830                        | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Oxalis corniculata L., 1753                                 | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | LC           |             |         |            |                       |
| Oxalis dillenii Jacq., 1794                                 | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |            |                       |
| Oxalis stricta L., 1753                                     |                 |                  |          |             |        |              |             |         |            |                       |
| Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012       | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012        | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                       |
| Panicum miliaceum L., 1753                                  | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |            |                       |
| Papaver argemone L., 1753                                   | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | NT          |         |            |                       |
| Papaver dubium L., 1753                                     | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Papaver rhoeas L., 1753                                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Papaver somniferum L., 1753                                 | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | LC           |             |         |            |                       |
| Parietaria judaica L., 1756                                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Parietaria officinalis L., 1753                             | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922              | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |            | Avérées<br>implantées |
| Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | Subspontané     | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |                       |
| Pastinaca sativa L., 1753                                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841                   | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |                       |
| Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821                         | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                       |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800                 | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                       |
| Persicaria maculosa Gray, 1821                              | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801   | Indigène        | RR               |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |            |                       |
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964         | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866                     | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |                       |
| Phalaris arundinacea L., 1753                               | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                       |
| Phalaris canariensis L., 1753                               | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |            |                       |
| Phleum pratense L., 1753                                    | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840           | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                       |
| Physalis alkekengi L., 1753                                 | Indigène        | RRR              |          |             |        | DD           | CR          |         |            |                       |
| Picris hieracioides L., 1753                                | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                       |

| Nom scientifique                                   | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|------------|
| Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Pinus sylvestris L., 1753                          | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802             | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | NT          |         |                    |            |
| Plantago coronopus L., 1753                        | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Plantago lanceolata L., 1753                       | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Plantago major L., 1753                            | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Plantago media L., 1753                            | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Platanus orientalis L., 1753                       | Sans objet      | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770        | Planté/cultivé  | .                |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Poa annua L., 1753                                 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Poa bulbosa L., 1753                               | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Poa compressa L., 1753                             | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Poa nemoralis L., 1753                             | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Poa pratensis L., 1753                             | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Poa trivialis L., 1753                             | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759              | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Polygonum aviculare L., 1753                       | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966           | Sténonaturalisé | RRR              |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |                    |            |
| Populus alba L., 1753                              | Eurynaturalisé  | C                |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |                    |            |
| Populus nigra L., 1753                             | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | DD          |         |                    |            |
| Populus tremula L., 1753                           | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804              | Eurynaturalisé  | C?               |          |             |        |              |             |         |                    |            |
| Portulaca oleracea L., 1753                        | Eurynaturalisé  | CC               |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Potamogeton crispus L., 1753                       | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Potamogeton lucens L., 1753                        | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Potamogeton nodosus Poir., 1816                    | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Potentilla inclinata Vill., 1788                   | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904          | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Potentilla norvegica L., 1753                      | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Potentilla recta L., 1753                          | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Potentilla reptans L., 1753                        | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |



| Nom scientifique                            | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Potentilla verna L., 1753                   | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Poterium sanguisorba L., 1753               | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Primula veris L., 1753                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Prunella vulgaris L., 1753                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Prunus avium (L.) L., 1755                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Prunus cerasus L., 1753                     | Subspontané     | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées      |
| Prunus domestica L., 1753                   | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Prunus laurocerasus L., 1753                | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Prunus serotina Ehrh., 1784                 | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées      |
| Prunus spinosa L., 1753                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Prunus x cerea (L.) Ehrh., 1792             | Planté/cultivé  | .                |          |             |        |              |             |         |                    |                         |
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879         | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834 | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Liste d'alerte          |
| Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800     | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Pyrus communis L., 1753                     | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Quercus robur L., 1753                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Ranunculus acris L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Ranunculus arvensis L., 1753                | Indigène        | RRR              |          |             |        | LC           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Ranunculus bulbosus L., 1753                | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Ranunculus parviflorus L., 1758             | Indigène        | RR               |          | PR          |        | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Ranunculus repens L., 1753                  | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Ranunculus sardous Crantz, 1763             | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Ranunculus sceleratus L., 1753              | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Raphanus raphanistrum L., 1753              | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Rapistrum rugosum (L.) All., 1785           | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Reseda alba L., 1753                        | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Reseda lutea L., 1753                       | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Reseda luteola L., 1753                     | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |

| Nom scientifique                                 | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF | EEE région         |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|------------|--------------------|
| Reynoutria japonica Houtt., 1777                 | Eurynaturalisé  | CC               |          |             |        | NA           |             |         |            | Avérées implantées |
| Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |            | Avérées implantées |
| Rhamnus cathartica L., 1753                      | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Ribes rubrum L., 1753                            | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Ribes uva-crispa L., 1753                        | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Robinia pseudoacacia L., 1753                    | Eurynaturalisé  | CCC              |          |             |        | NA           |             |         |            | Avérées implantées |
| Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821               | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rorippa palustris (L.) Besser, 1821              | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821             | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rosa arvensis Huds., 1762                        | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rosa canina L., 1753                             | Indigène        | C?               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971            | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |            |                    |
| Rubia tinctorum L., 1753                         | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | LC           |             |         |            |                    |
| Rubus caesius L., 1753                           | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rubus fruticosus L., 1753                        | Indigène        | CCC              |          |             |        |              | LC          |         |            |                    |
| Rubus idaeus L., 1753                            | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rubus koehleri Weihe, 1825                       | Sans objet      | .                |          |             |        |              |             |         |            |                    |
| Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813                | Sans objet      | .                |          |             |        |              |             |         |            |                    |
| Rubus rudis Weihe, 1825                          | Sans objet      | .                |          |             |        |              |             |         |            |                    |
| Rubus ulmifolius Schott, 1818                    | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rumex acetosella L., 1753                        | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rumex conglomeratus Murray, 1770                 | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rumex crispus L., 1753                           | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rumex hydrolapathum Huds., 1778                  | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rumex obtusifolius L., 1753                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |            |                    |
| Rumex patientia L., 1753                         | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |            |                    |
| Rumex thrysiflorus Fingerh., 1829                | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |            |                    |
| Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826       | Indigène        | AR?              |          |             |        |              | NA          |         |            |                    |



| Nom scientifique                                 | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Sagina apetala Ard., 1763                        | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Sagina procumbens L., 1753                       | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Salix alba L., 1753                              | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Salix caprea L., 1753                            | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Salix cinerea L., 1753                           | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Salix viminalis L., 1753                         | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Salix x rubens Schrank, 1789                     | Indigène        | ?                |          |             |        |              |             |         |                    |                         |
| Salvia pratensis L., 1753                        | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Salvia sclarea L., 1753                          | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Salvia verbenaca L., 1753                        | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Sambucus ebulus L., 1753                         | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Sambucus nigra L., 1753                          | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Samolus valerandi L., 1753                       | Indigène        | R                |          |             | Ar. ZH | LC           | NT          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Saponaria officinalis L., 1753                   | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Saxifraga tridactylites L., 1753                 | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Scabiosa columbaria L., 1753                     | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Scandix pecten-veneris L., 1753                  | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | VU          |         |                    |                         |
| Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812     | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888        | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Scorzonera hispanica L., 1753                    | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Scrophularia auriculata L., 1753                 | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Scrophularia nodosa L., 1753                     | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Scutellaria galericulata L., 1753                | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Secale cereale L., 1753                          | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                         |
| Sedum acre L., 1753                              | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Sedum album L., 1753                             | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Senecio inaequidens DC., 1838                    | Eurnaturalisé   | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Senecio viscosus L., 1753                        | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Senecio vulgaris L., 1753                        | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |

| Nom scientifique                             | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région         |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|
| Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812          | Indigène        | CC               |          |             |        | NA           | LC          |         |                    |                    |
| Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812     | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sherardia arvensis L., 1753                  | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Silene conica L., 1753                       | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |                    |
| Silene latifolia Poir., 1789                 | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Silene pendula L., 1753                      | Accidentel      | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869        | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sinapis alba L., 1753                        | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Sinapis arvensis L., 1753                    | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sison amomum L., 1753                        | Indigène        | R                |          | PR          |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sison segetum L., 1753                       | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | CR          |         |                    |                    |
| Sisymbrium altissimum L., 1753               | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Sisymbrium irio L., 1753                     | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Sisymbrium loeselii L., 1755                 | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772       | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sisymbrium orientale L., 1756                | Sténonaturalisé | RRR              |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Sium latifolium L., 1753                     | Indigène        | RRR              |          |             | Ar. ZH | NT           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |                    |
| Solanum dulcamara L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Solanum lycopersicum L., 1753                | Sténonaturalisé | RR               |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Solanum nigrum L., 1753                      | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Solanum tuberosum L., 1753                   | Planté/cultivé  | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |                    |
| Solanum villosum Mill., 1768                 | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                    |
| Solidago canadensis L., 1753                 | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées |
| Solidago gigantea Aiton, 1789                | Eurynaturalisé  | AC               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées |
| Sonchus arvensis L., 1753                    | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sonchus asper (L.) Hill, 1769                | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sonchus oleraceus L., 1753                   | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                    |
| Sonchus palustris L., 1753                   | Indigène        | R                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                    |



| Nom scientifique                                     | Statut région   | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région              |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Sorbus aucuparia L., 1753                            | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Sparganium erectum L., 1753                          | Indigène        | C                |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Stachys palustris L., 1753                           | Indigène        | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Stachys sylvatica L., 1753                           | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Stellaria media (L.) Vill., 1789                     | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912                | Indigène        | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914            | Eurynaturalisé  | AR               |          |             |        | NA           |             |         |                    | Potentielles implantées |
| Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995      | Subspontané     | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées      |
| Symphytum officinale L., 1753                        | Indigène        | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Syringa vulgaris L., 1753                            | Eurynaturalisé  | R                |          |             |        | NA           |             |         |                    | Avérées implantées      |
| Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844             | Sténonaturalisé | R                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Tanacetum vulgare L., 1753                           | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780                 | Indigène        | CCC?             |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Taxus baccata L., 1753                               | Eurynaturalisé  | C                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Teucrium chamaedrys L., 1753                         | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Teucrium scordium L., 1753                           | Indigène        | RR               |          |             | Ar. ZH | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |                         |
| Thalictrum flavum L., 1753                           | Indigène        | AR               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Thlaspi arvense L., 1753                             | Indigène        | RR               |          |             |        | LC           | VU          |         |                    |                         |
| Tilia cordata Mill., 1768                            | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Tilia platyphyllos Scop., 1771                       | Indigène        | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821                  | Indigène        | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830                  | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788                    | Indigène        | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Tradescantia x andersoniana F.Ludw. & Rohweder, 1954 | Planté/cultivé  | .                |          |             |        |              |             |         |                    |                         |
| Tragopogon dubius Scop., 1772                        | Indigène        | R                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |
| Tragopogon porrifolius L., 1753                      | Accidentel      | .                |          |             |        | LC           |             |         |                    |                         |
| Tragopogon pratensis L., 1753                        | Indigène        | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |                         |

| Nom scientifique                              | Statut région  | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH  | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|------------|
| Trifolium arvense L., 1753                    | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Trifolium campestre Schreb., 1804             | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Trifolium dubium Sibth., 1794                 | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Trifolium fragiferum L., 1753                 | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Trifolium pratense L., 1753                   | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Trifolium repens L., 1753                     | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Trifolium squamosum L., 1759                  | Accidentel     | .                |          |             | Ar. ZH | LC           |             |         |                    |            |
| Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Triticum aestivum L., 1753                    | Planté/cultivé | .                |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Tussilago farfara L., 1753                    | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Typha angustifolia L., 1753                   | Indigène       | AC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |            |
| Typha latifolia L., 1753                      | Indigène       | CC               |          |             | Ar. ZH | LC           | LC          |         |                    |            |
| Ulmus glabra Huds., 1762                      | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Ulmus laevis Pall., 1784                      | Indigène       | RR               |          |             | Ar. ZH | LC           | VU          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Ulmus minor Mill., 1768                       | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Urtica dioica L., 1753                        | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Urtica urens L., 1753                         | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Valeriana officinalis L., 1753                | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821       | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Vallisneria spiralis L., 1753                 | Eurynaturalisé | R                |          |             |        | LC           |             |         |                    |            |
| Verbascum blattaria L., 1753                  | Indigène       | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Verbascum lychnitis L., 1753                  | Indigène       | AR               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Verbascum thapsus L., 1753                    | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Verbena officinalis L., 1753                  | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Veronica agrestis L., 1753                    | Indigène       | R                |          |             |        | LC           | DD          |         |                    |            |
| Veronica arvensis L., 1753                    | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Veronica chamaedrys L., 1753                  | Indigène       | CCC              |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Veronica hederifolia L., 1753                 | Indigène       | CC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Veronica officinalis L., 1753                 | Indigène       | C                |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |
| Veronica persica Poir., 1808                  | Eurynaturalisé | CCC              |          |             |        | NA           |             |         |                    |            |
| Veronica polita Fr., 1819                     | Indigène       | AC               |          |             |        | LC           | LC          |         |                    |            |



| Nom scientifique                     | Statut région  | Fréquence région | Prot_Nat | Prot_Région | Ar_ZH | Cot_UICN_Nat | UICN région | Dir_Hab | Dét_ZNIEFF         | EEE région |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|-------|--------------|-------------|---------|--------------------|------------|
| Veronica praecox All., 1789          | Indigène       | RRR              |          |             |       | LC           | EN          |         | Déterminant ZNIEFF |            |
| Veronica serpyllifolia L., 1753      | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Veronica sublobata M.Fisch., 1967    | Indigène       | AR               |          |             |       | LC           |             |         |                    |            |
| Viburnum lantana L., 1753            | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Viburnum opulus L., 1753             | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Vicia angustifolia L., 1759          | Indigène       | AR               |          |             |       | LC           |             |         |                    |            |
| Vicia cracca L., 1753                | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Vicia dasycarpa Ten., 1829           | Indigène       | RR               |          |             |       | LC           |             |         |                    |            |
| Vicia lens (L.) Coss. & Germ., 1845  | Planté/cultivé | .                |          |             |       |              |             |         |                    |            |
| Vicia sativa L., 1753                | Eurynaturalisé | CCC              |          |             |       | NA           |             |         |                    |            |
| Vicia segetalis Thuill., 1799        | Indigène       | AC               |          |             |       | LC           |             |         |                    |            |
| Vicia tenuifolia Roth, 1788          | Indigène       | R                |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Vicia villosa Roth, 1793             | Indigène       | R                |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Viola arvensis Murray, 1770          | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Viola hirta L., 1753                 | Indigène       | C                |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Viola odorata L., 1753               | Indigène       | CCC              |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Viola tricolor L., 1753              | Indigène       | RR               |          |             |       | LC           | DD          |         |                    |            |
| Viscum album L., 1753                | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Vitis vinifera L., 1753              | Indigène       | ?                |          |             |       | LC           | CR          |         |                    |            |
| Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821     | Indigène       | AC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805   | Indigène       | CC               |          |             |       | LC           | LC          |         |                    |            |
| Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826 | Planté/cultivé | .                |          |             |       | NA           |             |         |                    |            |
| Xanthium strumarium L., 1753         | Accidentel     | .                |          |             |       | LC           |             |         |                    |            |
| Zannichellia palustris L., 1753      | Indigène       | AR               |          | PR          |       | LC           | LC          |         |                    |            |





*Octobre 2022*

**TRANS  
FAIRE**

